


KLIMA BULLETIN

27/2026

TÝDENNÍ AKTUALITY OD TÝMU **INTERSUCHO**
NEJEN O SUCHU, POŽÁRECH, HORKU A ZMĚNĚ KLIMATU

V Brně se první půlrok teplotně zařadil na šesté místo. Srážky pomohly zmírnit půdní sucho v Čechách, v hlubších vrstvách půdy však dlouhodobý vláhový deficit přetrvává na většině území. V Jihomoravském a Olomouckém kraji se hodnoty relativního nasycení půdy pohybují blízko bodu vadnutí.




OBSAH

Šestý nejteplejší první půlrok v Brně	3
Srážky pomohly zmírnit půdní sucho v Čechách	4
V hlubších vrstvách půdy přetrvává dlouhodobý vláhový deficit	5
Požární riziko se bude Česku rychle zvyšovat	8
Velkou část střední Evropy zasahuje extrémní sucho	9
Vegetace ve střední Evropě čelí výraznému stresu suchem	10
Zvýšený tepelný stres na jihu Evropy	11
Riziko požárů v Evropě znovu poroste	12

ŠESTÝ NEJTEPLEJŠÍ PRVNÍ PŮLROK

V Brně, pro které je k dispozici druhé nejdelší měření v republice, se první půlrok z hlediska teploty vzduchu zařadil na šesté místo. Období, kdy bylo prvních šest měsíců roku podprůměrných, se naposledy vyskytlo v roce 2006 (obr. 1). Pomyslnou první příčku zatím obsadil rok 2024, který ten letošní ještě výrazněji překonal. Naopak historicky nejchladnější první část roku byla zaznamenána v roce 1929.




Obrázek 1: Odchylka průměrné teploty vzduchu v Brně v prvním půlroce oproti referenčnímu období 1961–1990.



SRÁŽKY POMOHLY ZMÍRNIT PŮDNÍ SUCHO V ČECHÁCH

Nejvíce srážek bylo v uplynulém týdnu zaznamenáno od pondělí do středy. Srážky se objevovaly převážně v Čechách, kde úhrny velmi často dosahovaly 20–60 mm za týden, lokálně i více. Naopak na Moravě téměř nepršelo, většinou spadlo jen okolo 5 mm za týden (obr. 2).




Obrázek 2: Desetidenní srážkový úhrn za období 29. 6.–5. 7. 2026.



V HLUBŠÍCH VRSTVÁCH PŮDY PŘETRÁVÁ DLOUHODOBÝ VLÁHOVÝ DEFICIT

Půdní sucho výrazně ustoupilo v povrchové vrstvě do 40 cm. V hlubších vrstvách, tedy v hloubce 40–100 cm, sice intenzivní srážky na mnoha místech v Čechách pomohly, dlouhodobý deficit však zcela vyrovnat nedokázaly. V Jihomoravském a Olomouckém kraji se hodnoty relativního nasycení půdy pohybují pod 10 %, což je již blízko bodu vadnutí. Ten je momentálně pozorován na 9 % území republiky v celém profilu 0–100 cm. Na téměř polovině území republiky pak chybí 20–40 mm půdní vláhy, na severní Moravě dokonce 40–60 mm (obr. 3).




Obrázek 3: Kompozit relativního nasycení půdy, intenzity sucha, deficitu půdní vláhy a obsahu vody ve třech půdních vrstevkách ke dni 5. 7. 2026.




V HLUBŠÍCH VRSTVÁCH PŮDY PŘETRÁVÁ DLOUHODOBÝ VLÁHOVÝ DEFICIT

Vzhledem k tomu, že v dalších dnech neočekáváme příliš mnoho srážek a teploty porostou, půdní sucho se bude opět rozšiřovat (obr. 4). V polovině měsíce bude snižená půdní vláhla znovu patrná v celé republice a nejhroší stupeň sucha dokonce na více než polovině jejího území. Horší situace bude nadále na Moravě. Relativní nasycení půdy pod 10 %, což je již blízko bodu vadnutí, bude stále pozorováno v Jihomoravském a Olomouckém kraji a také na řadě míst v Čechách (obr. 5).



Obrázek 4: Vývoj intenzity půdního sucha v Česku za poslední dva měsíce a předpověď na následujících 10 dnů.



Infografiku v plné velikosti najdete [zde](#).

INTER**SUCHO**

INTER**SUCHO**.CZ

SLEDUJTE PRO VÍCE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ



V HLUBŠÍCH VRSTVÁCH PŮDY PŘETRÁVÁ DLOUHODOBÝ VLÁHOVÝ DEFICIT


PŘEDPOVĚĎ RELATIVNÍHO NASYCENÍ PŮDY

V půdním profilu 0 – 100 cm

INTERSUCHO

Zdroj dat: ECMWF/IFS

Datum vydání: 06.07.2026



Obrázek 5: Předpověď relativního nasycení půdy v půdním profilu 0–100 cm pro období 6. 7.–15. 7. 2026.

INTERSUCHO


INTERSUCHO.CZ

SLEDUJTE PRO VÍCE AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ



POŽÁRNÍ RIZIKO SE BUDE ČESKU RYCHLE ZVYŠOVAT

Po chvíli „klidu“, kterou nám dopřály hlavně srážky v Čechách, se bude požární riziko opět rychle zvyšovat. Až do poloviny července bude hlavní ohnisko rizika na jižní Moravě, od pátku se však riziko zvýší i v Čechách.



Obrázek 6: Předpověď požárního rizika v období 6. 7.-15. 7. 2026.

FIRE!ISK

FIRERISK.CZ


PRO STAV A PŘEDPOVĚĎ POŽÁRNÍHO RIZIKA



VELKOU ČÁST STŘEDNÍ EVROPY ZASAHUJE EXTRÉMNÍ SUCHO

Významná odchylka sucha se aktuálně nachází ve střední části sledovaného regionu střední Evropy, tedy v jižní části Německa, Česku, na Slovensku, v jihovýchodní části Polska, západní části Ukrajiny a v Rakousku. Dále se vyskytuje také v severní části Itálie a ve Francii. Převažuje výskyt extrémního sucha, tedy nejvýraznější odchylky aktuálního stavu od dlouhodobého průměru za období 1981–2020, která se projevuje nejen v povrchové vrstvě (obr. 7), ale i v hlubších vrstvách půdy, do 1 a 2 metrů.

V následujících dnech se bude tato anomálie rozšiřovat a sucho se bude dále prohlubovat, zejména ve střední Evropě v povrchové vrstvě půdy. V hlubších vrstvách zasáhne větší část Evropy.



Obrázek 7: Předpověď intenzity sucha ve vrstvě půdy 0–40 cm pro období 6. 7.–15. 7. 2026.

CLIM4CAST


CLIM4CAST

MONITORING A PŘEDPOVĚĎ SUCHA, VEDRA A POŽÁRU
V EVROPĚ



VEGETACE VE STŘEDNÍ EVROPĚ ČELÍ VÝRAZNÉMU STRESU SUCHEM

Relativní nasycení půdy ukazuje, že vegetace je stresována suchem: nasycení se na většině monitorovaného území pohybuje v rozmezí 0–40 %, výjimkou jsou pouze horské polohy a severní Polsko v povrchové vrstvě (obr. 8).



Obrázek 8: Předpověď relativního nasycení půdy ve vrstvě 0–40 cm pro období 6. 7.–15. 7. 2026.

CLIM4CAST


CLIM4CAST

MONITORING A PŘEDPOVĚĎ SUCHA, VEDRA A POŽÁRU
V EVROPĚ



ZVÝŠENÝ TEPELNÝ STRES NA JIHU EVROPY

V následujících dnech se bude dle indexu UTCI (obr. 9) vyskytovat zvýšený tepelný stres spíše v jižních částech sledované oblasti, tedy v Itálii, na jihu Francie a v Řecku.



Obrázek 9: Předpověď Univerzálního tepelně-klimatického indexu (UTCI) vyjadřujícího míru tepelného stresu pro období 6. 7.-15. 7. 2026.

Poznámka: UTCI je bioklimatický index, který popisuje fyziologický komfort lidského těla za specifických meteorologických podmínek. Bere v úvahu okolní teplotu, ale také faktory, jako je vlhkost, vítr a záření, které významně ovlivňují fyziologickou odezvu na prostředí

CLIM4CAST


CLIM4CAST

MONITORING A PŘEDPOVĚĎ SUCHA, VEDRA A POŽÁRU
V EVROPĚ



RIZIKO POŽÁRŮ V EVROPĚ ZNOVU POROSTE

Riziko šíření požáru je a bude vysoké zejména v oblastech, které jsou zasaženy také suchem, tedy především v jižních částech Německa, Francie a Itálie a v zemích střední Evropy. Výjimkou je Polsko, kde se riziko vyskytuje spíše v nízké až mírné kategorii. S postupujícím a prohlubujícím se suchem se bude v následujících devíti dnech riziko vzniku a šíření požáru dále zvyšovat, a to opět zejména v zemích střední Evropy, ale také v jižních částech Evropy, například v Itálii.



Obrázek 10: Předpověď šíření požárů pro období 6. 7.–15. 7. 2026.

CLIM4CAST

CLIM4CAST

MONITORING A PŘEDPOVĚĎ SUCHA, VEDRA A POŽÁRU
V EVROPĚ



MÁTE JAKÝKOLI DOTAZ NEBO NÁPAD NA ZLEPŠENÍ? – POTŘEBUJETE SE S NÁMI SPOJIT? – JSME TU PRO VÁS!



KONTAKT

Monika Hojdanová
+ 420 774 679 349
hojdanova.m@czechglobe.cz

Ústav výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

AUTOŘI TOHOTO ČÍSLA

- Lenka Bartošová
- Monika Hojdanová
- Pavel Zahradníček

JSME ON-LINE!

ÚSTAV VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR



WEB
CZECHGLOBE



LINKED-IN
CZECHGLOBE



FACEBOOK
CZECHGLOBE



INSTAGRAM
CZECHGLOBE



INTERSUCHO

FIRERISK

AGRORISK

DENDRONETWORK

